

# ANTIBIOTHERAPIE PROBABILISTE LORS DES INFECTIONS ORL (SPILF 2011)

La prescription d'antibiothérapie doit être proscrite (au regard des conséquences individuelles et collectives qu'elle entraîne) dans les situations suivantes :

- 1- Rhinopharyngite, même en cas de sécrétions nasales d'aspect purulent ou muco-purulent,
- 2- Angine à TDR- ou en l'absence d'utilisation de TDR
- 3- Otite congestive de l'enfant
- 4- Otite sero-muqueuse de l'enfant

L'amoxicilline est la molécule recommandée en première intention dans l'immense majorité des situations où les antibiotiques sont justifiés



Otite moyenne aiguë purulente

Sinusite maxillaire

Angine à streptocoque du groupe A

ADULTES

1 gr 3 fois par jour :  
pendant 8 jours

1 gr 3 fois par jour :  
pendant 8 jours

1 gr 2 fois par jour :  
pendant 6 jours

ENFANTS

80 – 90 mg/kg/j 2  
prises/jour  
≤ 2 ans :  
pendant 8 – 10 jrs  
> 2 ans :  
pendant 5 jrs

80 – 90 mg/kg/j  
2 prises/jour  
pendant 8 – 10 jrs

50 mg/kg/j  
2 prises/jour  
pendant 6 jrs

## Les exceptions à l'amoxicilline en première ligne

## Situations cliniques

### •OMA purulente + conjonctivite

- Amoxicilline/ac-clavulanique 80 mg/kg/j en 2 ou 3 prises sans dépasser la posologie adulte 3 gr/j

### •Sinusite frontale

- Enfant : amoxicilline/ac-clavulanique 80 mg/kg/j en 2 ou 3 prises sans dépasser la posologie adulte 3 gr/j
- Adulte : amoxicilline/ac-clavulanique 3 gramme par jour en 3 prises

## Les exceptions à l'amoxicilline en première ligne

### Allergie aux pénicillines (1)

### •OMA purulente ou sinusite, ou angine en cas d'allergie aux pénicillines sans allergie aux céphalosporines

- Enfant : cefpodoxime 8 mg/kg/j en 2 prises par jour sans dépasser la dose adulte
  - Durée 5 jours pour l'angine
  - Identique à l'amoxicilline pour les autres indications
- Adulte
  - Cefpodoxime
    - 400 mg/j en 2 prises par jour pour les otites et sinusites (durée identique à l'amoxicilline)
    - 200 mg/j en 2 prises par jour pour les angines (durée 5 jours)
  - Céfuroxime-axétil : 500 mg en 2 prises par jour
    - Durée 4 jours pour l'angine
    - Durée identique à l'amoxicilline pour les autres indications

## Les exceptions à l'amoxicilline en première ligne

### Allergie aux pénicillines & aux céphalosporines

- **OMA purulente et sinusite enfant (<6 ans) :**

Pediazole® : 50 mg d'érythromycine et 150 mg de sulfafurazole en 3 prises par jour  
(durée identique à l'amoxicilline)

- **Otite et sinusite (durée identique à l'amoxicilline)**

- enfant > 6 ans : Pyostacine® : 50 mg/kg/j en 3 prises (durée identique à l'amoxicilline)
- adulte : Pyostacine® : 3 grammes/j en 3 prises

- **Angine**

- azithromycine

- Enfant : 20mg/kg/j en une prise par j pour 3 j
- Adulte : 500 mg/j en une prise par j pour 3 j

- clarithromycine

- Enfant : 15 mg/kg/j en deux prises par j pour 5 j
- Adulte : 500 mg/j en deux prises par j pour 5 j

- josamycine

- Enfant : 50 mg/kg/j en deux prises par j pour 5 j
- Adulte : 2 g/j en deux prises par j pour 5 j