

INFECTIONS CUTANÉES

E. PILLY 2008, 21ème édition, Collège des Universitaires de Maladies Infectieuses et Tropicales, Edition et communication -
 PRINCIPLES AND PRACTICE OF INFECTIOUS DISEASES, 5ème édition, Mandell GL anc col. ; Churchill livingstone
 CONFERENCE DE CONSENSUS : Erysipèle et Fasciite nécrosante, 26 janv 2000. Société Française de Dermatologie et SPILF.
 IDSA.Practice guidelines for the diagnosis AND management OF skin AND soft-tissue infections. Clin Infect

Dermo-hypodermite (érysipèle) sur peau saine	Prélèvements locaux +3 hémocultures	AMOXICILLINE - CLAMOXYL® : 1 à 2 g x 3 / j IV ou per os (plus de 50 mg/Kg/j)	Pendant 10-15 jours
		ou CLINDAMYCINE- DALACINE® : 25-30mg/kg/24h en 3 à 4 fois par jour per os	Si allergie aux bêta lactamines
Dermo-hypodermite (érysipèle) sur peau avec troubles trophique sans nécrose	Prélèvements locaux +3 hémocultures	AMOXI + AC. CLAV .- AUGMENTIN® : 1 à 2 g x 3 / j (50-80mg/kg/24h d'AMOX)	Pendant 21 jours
		et GENTAMICINE 3mg/kg/24h	si fct rénale normale et si sepsis sévère, sans dépasser 3 j
		ou PRISTINAMYCINE – PYOSTACINE® 500 mg : 2cps x 3 / j per os	Si allergie aux bêta lactamines
		ou CLINDAMYCINE- DALACINE® : 25-30mg/kg/24h en 3 à 4 fois par jour per os	Si allergie aux bêta lactamines
Fasceite nécrosante ou gangrèneuse	CPK et LDH ↗↗	Avis spécialisé (chirurgie et infectieux) pour prise en charge médicochirurgicale en urgence	
Escarre		Soins locaux	
Morsure de chien ou chat		AMOXI + AC. CLAV .- AUGMENTIN® : 1 à 2 g x 3 / j (50-80mg/kg/24h d'AMOX)	Pendant 7 ou 14 jours fonction profondeur et évolution
		ou DOXYCYCLINE : 200mg / j en 1 prise	Si allergie aux bêta lactamines
Morsure de tique (ECM)		AMOXICILLINE - CLAMOXYL® : 1 g x 3 / j (50mg/kg/j)	Pendant 14 jours
		ou DOXYCYCLINE : 200mg/j en 1 prise	Si allergie aux bêta lactamines
Staphylococcie maligne de la face	Prélèvements locaux +3 hémocultures	OXACILLINE - BRISTOPEN® : 2 g X 3 / j IV	Pendant 14 jours
		et GENTAMICINE 3mg/kg/24h	Si fct rénale normale, sans dépasser 3 j
		ou VANCOMYCINE : 30 mg/Kg/j IV en continu, à adapter dès que résultat antibiogramme	Si suspicion de Staphylocoque résistant à la méthicilline

