



FICHE TECHNIQUE

SCORE NIHSS2



INSTRUCTION	COTATION	SCORE
1.NIVEAU DE CONSCIENCE: stimulation verbale ou douloureuse	1- vigilant	
	2- répond aux stimuli mineurs	
	3- répond aux stimuli répétés ou douloureux	
	4- réponse stéréotypée flasque	
2.NIVEAU DE CONSCIENCE : âge? Mois?	0- réponse aux 2 questions	
	1- réponse à 1 question ou intubé ou dysarthrie	
	2- pas de réponse ou aphasie	
3.CONSCIENCE-COMMANDES : ouvrir fermer yeux et mains sur commande ou imitation	0- exécute 2 ordres	
	1- exécute 1 ordre	
	2- pas de réponse	
4.OCULOMOTRICITE HORIZONTALE: suivre le doigt	0- normale	
	1- déviation conjuguée des yeux réductible	
	2- paralysie complète de la latéralité	
5.CHAMP VISUEL : 4 quadrants recherche d'une hémianopsie latérale homonyme	0- normal	
	1- HLH partielle	
	2- HLH complète	
	3- HLH double cécité corticale	
6.PARALYSIE FACIALE : montrer les dents , lever les sourcils, fermer les yeux	0- normal	
	1- PF centrale discrète (surtout partie inf du visage)	
	2- PF centrale nette (inférieure totale)	
7.MOTRICITE DES MEMBRES SUPERIEURS: tendre main et bras pendant 10 secondes	3- PF double ou totale	
	0- normal	
	1- résiste à la pesanteur (<10s)	
	2- ne résiste pas à la pesanteur	
8.MOTRICITE DES MEMBRES INFERIEURS: tendre les jambes pendant 5 secondes	3- ne lève pas le membre	
	4- aucun mouvement	
	0- normal	
	1- résiste à la pesanteur (<10s)	
	2- ne résiste pas à la pesanteur	
9.ATAXIE DES MEMBRES: mettre index sur nez, talon sur genou	3- ne lève pas le membre	
	4- aucun mouvement	
	0- normal ou paralysie ou aphasie	
	1- ataxie d'1 membre	
10.SENSIBILITE : piqure ou douleur	2- ataxie des 2 membres	
	9- amputation ou blocage articulaire	
	0- normale	
11.LANGAGE: décrivez une scène, donnez le nom d'objet, lire des phrases	1- hypoesthésie ou aphasie ou stupeur	
	2- déficit sévère ou total	
	0- normal	
12.DYSARTHRIE: répéter les mots suivants : maman, tictac, moitié moitié, éclabousser, cinq, éclabousser, bébé pleureur, catégorique	1- aphasie mais communique	
	2- communication quasi-impossible	
	3- aphasie globale, mutisme ou coma	
13.EXTINCTION*-NEGLIGENCE: tester sensibilité simultanée bilatérale, tester la perception visuelle simultanée, recherche d'anosognosie* et négligence visuospatiale	0- articulation normale	
	1- compréhensible	
	2- incompréhensible ou anarthrie ou mutisme	
	9- intubation ou obstacle mécanique	
14. MOTRICITE DISTALE: extension des doigts pendant 5secondes	1- pas d'extinction	
	2-extinction à une seule modalité	
	3-extinction plurimodale ou négligence	
	0- normal	
	1- extension incomplète	
	aucune extension volontaire	
	9- amputation ou blocage articulaire	

EXTINCTION: insensibilité d'un coté du corps lors d'une stimulation bilatérale simultanée alors que la perception est normale lorsque chacun des 2 côtés est stimulé isolément l'extinction peut-être visuelle, auditive, ou tactile
ANOSOGNOSIE: absence de conscience du trouble