PROTOCOLES THERAPEUTIQUES BRADYCARDIE

DEFINITION :

Fréquence cardiaque < 60 battements / min

DIAGNOSTIC :

Signes cliniques :

Anamnèse et antécédents indispensables

Prise du pouls

ECG 12 dérivations + D2 long

Signes de gravité :

Syncope, bas débit, PAS < 90 mm Hg, FC < 40 / min, nombreuses extrasystoles

PIEGES :

β -bloquants, Calcium-bloquants, sportifs, hypothermie

TRAITEMENT :

BK bien tolérée = RESPECTER

BK mal tolérée = TRAITER Atropine

Adulte : 0,5 mg IV, à répéter si nécessaire toutes les 3 min, jusqu'à 3 mg max

Pas de dose < 0,5 mg car risque de **bradycardie paradoxale** Attention, sans effet sur un cœur transplanté dénervé

Enfant : 20 μ g / kg par injection, à répéter une fois au maximum

Si inefficace :

Adrénaline

- en 1^{ère} intention, 2 - 10 μ g / kg / min

- débuter à 0,5 mg / h pour un adulte de 70 kg (5 mg / 50 ml vitesse 2,5 ml / h)
puis QSP FC 50 - 70 battements / min

ou

Isuprel[®]

- en alternative (mais plus en 1^{ère} intention)

- 5 ampoules de 0,2 mg (soit 1 mg) dans seringue 50 ml
QSP FC 50 - 70 battements / min

Si inefficace :

Pacing externe (EASE) sous couvert d'une sédation - analgésie efficace ou interne (SEES) (cf. protocole p.81)

De manière concomitante : **Gestes de survie standard Traitement**

étiologique : IDM inférieur +++ (BAV transitoire), antérieur (BAV définitif) Glucagon dans les intoxications aux α -bloquants (cf. protocole p.45)...

TRANSPORT :

Surveillance : paramètres vitaux

Position : demi-assise (jambes pendantes)

ORIENTATION :

USIC, UHCD ou SAU si amélioration nette, réanimation si ventilation nécessaire