PROTOCOLES THERAPEUTIQUES

EPIGLOTTITE AIGÛE

DEFINITION :

Abcès et œdème sus glottique d'origine bactérienne à *Haemophilus Influenzae* type B

Age moyen : 3 ans

Saison : automne, hiver

De plus en plus rare grâce au vaccin

DIAGNOSTIC :

Signes cliniques :

- Début brutal +++, volontiers nocturne
- Dyspnée inspiratoire, enfant assis, penché en avant, bouche ouverte, langue tirée
- Hypersialorrhée, voix étouffée, dysphagie
- Fièvre élevée
- Signes de gravité :
- Hypotonie, troubles de conscience Pâleur
- Bradypnée, signes de lutte respiratoire
- Arrêt cardiorespiratoire

TRAITEMENT :

Urgence absolue +++

Respecter la position assise

Contre-indication formelle à tout examen endobuccal

Oxygénothérapie : systématique MHC QSP $SpO_2 \geq 95\%$

VVP (selon bénéfice - risque à apprécier en fonction délai de PEC)

Pas de corticoïdes

Antibiothérapie urgente :

Rocéphine[®] IVD (ou IM) enfant 50 mg / kg sans dépasser 1 g (< 30 kg), 2 g chez adulte

Si asphyxie :

- Intubation trachéale délicate en position assise **sans curares +++**
- Manœuvres de trachéostomie de sauvetage par pose d'un cathéter 14 G ou minitrachéotomie **Minitrach**[®] ou sur sonde d'intubation n° 3,5 - 4 toujours sous le cartilage thyroïde dans la membrane cricothyroïdienne

TRANSPORT :

Rapide +++

Surveillance : paramètres vitaux, signes de lutte, conscience

Position : assise, penchée en avant

ORIENTATION :

Systématique directement au bloc opératoire

Anesthésiste et chirurgien ORL prévenus par le médecin régulateur