PROTOCOLES THERAPEUTIQUES

ENVENIMATION PAR MORSURE DE VIPERE

DEFINITION :

Deux espèces : vipera aspis et vipera berus, rechercher la trace des 2 crochets
Gravité liée à l'envenimation, directement corrélée à la quantité de venin injecté et à sa concentration plasmatique
Pic maximal du venin dès la 30ème minute

DIAGNOSTIC :

Signes cliniques :

Grade 0 : morsure blanche

- Trace de crochets au niveau de la morsure, pas d'œdème, ni de réaction locale

Grade 1 : envenimation mineure

- Oedème local, absence de signes généraux

Grade 2 : envenimation modérée

- Oedème régional du membre
- Symptômes généraux modérés (malaise, vomissements, douleur abdominale, diarrhées)

Grade 3 : signes de gravité = envenimation sévère

- Oedème extensif atteignant le tronc
- Choc
- Atteintes viscérales
- CIVD

PIEGES :

L'œdème peut masquer la morsure

TRAITEMENT :

Pas de garrot, ni utilisation d'**Aspivenin®**
Repos strict (évite la diffusion du venin)
Retirer bagues, bracelets et garrots potentiels
Application locale de packs réfrigérants **Easy Ice®**
Désinfection locale

Grades 0 et 1 :

Surveillance, traitement antalgique (pas d'aspirine)

Grades 2 et 3 ou **signes biologiques de gravité** en TIH :

(hyperleucocytose > 15 000 / mm3, plaquettes < 150 000 / mm3, fibrinogène < 2 g / l, TP < 60 %)

Voie veineuse périphérique

Immunothérapie par **Viperfav® IV le + précocement possible** (effet maximal)

- à **prendre au départ :** dans le frigo à HEH ou à la pharmacie de l'établissement
- adulte / enfant (quels que soient l'âge et le poids), 1ère dose de 4 ml dans 100 ml de NaCl 9 ‰
- **débuter lentement** 15 gouttes / min pendant 5 - 10 min, puis perfuser en 1 h
- rarement : une 2ème dose 5 h plus tard est nécessaire (pas de 3ème ou 4ème dose)
- effets secondaires : réactions allergiques ou anaphylactiques (arrêt immédiat de la perfusion)

Si état de choc **:**

Remplissage par cristalloïdes et / ou HEA ± noradrénaline

TRANSPORT :

Surveillance : paramètres vitaux
Position : décubitus dorsal

ORIENTATION : Grades 0 ou **1 :** SAU ou UPATOU ou surveillance UHCD
Grades 2 ou **3 :** réanimation